

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΗ

Συμπλήρωμα υγείας

D 34.12 Διαμόρφωση πολλαπλών ουσιών

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
TIGER BALM® RED, αλοιφή

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο προτού εφαρμοστεί το TIGER BALM RED επειδή περιέχει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

Το TIGER BALM RED διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή.

Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήστε το TIGER BALM RED προσεκτικά για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από αυτό.

- Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο. Ισως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Μην μοιράζεστε το TIGER BALM RED με οποιοδήποτε άλλο άτομο.
- Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Πρέπει να δείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ή δεν βελτιωθούν μετά από 2 εβδομάδες.

Τι περιέχει το κόκκινο βάλσαμο TIGER BALM® RED, αλοιφή

Το TIGER BALM RED περιέχει φυσική καμφορά 11,0% w / w,

levomenthol (μενθόλη) 10,0% w / w,

λάδι κατζουππιού 7,0% κ.β.,

λάδι μέντας με άζωτο 6,0% κ.β.,

λάδι γαρίφαλου 5,0% κ.β. καθώς και

κασία λάδι, σκληρή παραφίνη και κίτρινη μαλακή παραφίνη.

ΓΙΑ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ TIGER BALM RED

Για την προσωρινή ανακούφιση των μυϊκών πόνων και των πόνων, καθώς και του ρευματικού πόνου, των διάστρεμμάτων, μώλωπες, εξάρθρωσεις και πόνους στην πλάτη.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ TIGER BALM RED

Μην εφαρμόζετε το TIGER BALM RED

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του TIGER BALM RED.
- εάν έχετε οποιοδήποτε είδος δερματικής νόσου.
- σε βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών.
- σε ανοιχτές πληγές ή σε φλεγμονή ή ερεθισμένο δέρμα.
- εάν έχετε άσθμα ή άλλες πνευμονικές παθήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το TIGER BALM RED

- Κρατήστε το TIGER BALM RED μακριά από τους βλεννογόνους όπως το ευαίσθητο και υγρό μέσα ή γύρω από τα μάτια, το στόμα και τη μύτη.
- Μην επιδέσετε περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει TIGER BALM RED.
- Μην εισπνέετε το TIGER BALM RED και μην το εφαρμόζετε στη μύτη.
- Μην χρησιμοποιείτε το TIGER BALM RED κοντά στη μύτη των μωρών ή των μικρών παιδιών, όπως άλλα παρόμοια προϊόντα έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν δυσκολίες ή διαταραχές στην κανονική αναπνοή, ή σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων (σημαντική πτώση αρτηριακής πίεσης ή και πρήξιμο του λαιμού).

Εγκυμοσύνη και θηλασμός

Η ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό δεν έχει τεκμηριωθεί. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και θηλασμού.

Συμβουλευτείτε πάντα τον επαγγελματία υγείας σας προτού χρησιμοποιήσετε φάρμακα εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Λήψη άλλων φαρμάκων με TIGER BALM RED

Πάντα να ενημερώνετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Αυτό περιλαμβάνει συμπληρωματικά ή παραδοσιακά φάρμακα.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε άλλα τοπικά

ανακουφιστικά προϊόντα που περιέχουν παρόμοια συστατικά, καθώς αυτό μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δοσολογία.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για ιατρική συμβουλή όταν χρειάζεται.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ TIGER BALM

Εφαρμόζετε πάντα TIGER BALM RED σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες (θα πρέπει να το ελέγξετε με το επαγγελματίας υγείας, γιατρός ή φαρμακοποιός εάν δεν είστε σίγουροι).

Το TIGER BALM RED προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση.
Ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών: Τρίψτε απαλά τα προσβεβλημένα μέρη του δέρματος ως απαραίτητο, συνήθως 2 ή 3 φορές την ημέρα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας εάν η κατάστασή σας επιδεινωθεί ή δεν βελτιωθεί μετά από 2 εβδομάδες.

Εάν εφαρμόσετε περισσότερο TIGER BALM ΚΟΚΚΙΝΟ από την κανονική ή καταπιείτε

Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. εάν δεν είναι διαθέσιμο, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο νοσοκομείο ή δηλητήριο Κέντρο ελέγχου. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ενδέχεται να εμφανίσετε κάποιες παρενέργειες, όπως ερεθισμός του δέρματος. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης της αλοιφής από ένα παιδί, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή επαγγελματία υγείας χωρίς καθυστέρηση για την παροχή της απαραίτητης θεραπείας.

Μην προσπαθήσετε να προκληθεί εμετός.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το TIGER BALM RED μπορεί να έχει παρενέργειες.

Δεν περιλαμβάνονται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν για το TIGER BALM RED σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Σε περίπτωση που η γενική υγεία σας επιδεινώνεται ή εάν εμφανίσετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση του TIGER BALM ΚΟΚΚΙΝΟ, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό, το φαρμακοποιό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας.

Η συχνότητα δεν είναι γνωστή

- Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως εξανθήματα ή δερματίτιδα εξ επαφής. Εάν συμβεί αυτό, διακόψτε την χρηση και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Πόνος, εγκαύματα ή φουσκάλες στον τόπο εφαρμογής.

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές.

Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική βοήθεια.

- Το TIGER BALM RED μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα ή ερεθισμό του δέρματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος στους 30 ° C ή κάτω.

Κρατήστε το βάζο καλά κλειστό.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο βάζο και στο κουτί.

Επιστρέψτε όλα τα αχρησιμοποίητα βάλσαμα στον φαρμακοποιό σας. Μην πετάτε το αχρησιμοποίητο βάλσαμο σε αποχετεύσεις ή συστήματα αποχέτευσης (π.χ. τουαλέτες).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το TIGER BALM RED είναι μια λιπαρή αλοιφή με κοκκινωπό χρώμα.

Η αλοιφή παρέχεται σε βιδωτά γυάλινα βάζα που περιέχουν αλοιφή 19 g.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αυτό το μη καταχωρισμένο βάλσαμο δεν έχει αξιολογηθεί από την ΕΟΦ για την ποιότητα, την ασφάλειά του ή προβλεπόμενη χρήση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ

Xiamen Tiger Medicals Co. Ltd., για την Haw Par Healthcare Ltd., Singapore με άδεια από την Haw Par Corporation Ltd.

Διεύθυνση κατασκευαστή: No 289, West Yangguang Road,
Haicang District, Xiamen City, Επαρχία Fujian, Κίνα

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Schleswiger Str. 74

24941 Flensburg

E-Mail: info(at)queisser.de